



Dringend vereiste toelating van LTO Nederland van het middel **Admire O-TEQ**,  
toelatingnummer 12976 N

A.  
WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT

Toegestaan is uitsluitend het gebruik als insectenbestrijdingsmiddel met maximaal 1 toepassing per teelt of teeltseizoen

in de **teelt van spruitkool** als

- traybehandeling vóór het planten vanaf 1 februari 2008 tot en met 30 juni 2008 *of*
- toegepast door middel van de phytodrip-techniek vanaf 1 december 2007 tot en met 30 april 2008.

*Attentie:*

Het is gevaarlijk en niet toegestaan in één teelt of teeltseizoen zowel Gaucho Tuinbouw (zaadbehandeling *of* dummpil) als Admire O-TEQ (traybehandeling *of* phytodrip-techniek) toe te passen. Dus: slechts één van de genoemde middelen en toepassingstechnieken is toegestaan per teelt of teeltseizoen.

Een traybehandeling vóór het planten, dan wel een phytodripbehandeling van spruitkool, met dien verstande dat maximaal 40.000 planten per hectare mogen worden geplant. De traybehandeling is uitsluitend toegestaan op een niet doorlatende ondergrond die niet afwatert op oppervlaktewater of in kassen met een volledig gesloten recirculatiesysteem.

Dit middel is schadelijk bij opname door de mond.

Het volgende moet daarom in acht worden genomen:

- Draag geschikte handschoenen tot en met het poten van behandelde planten.
- Niet roken tijdens gebruik.
- In geval van inslikken, onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen.

Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor mens en milieu te voorkomen.

B.  
GEBRUIKSAANWIJZING

**Algemeen**

Admire O-TEQ is een systemisch werkend middel. Het middel wordt door de wortels opgenomen en door de hele plant verspreid. De werkingssnelheid wordt mede bepaald door de activiteit van het gewas.

**Toepassingen**

Spruitkool, ter bestrijding van de kool witte vlieg (*Aleyrodes proletella*)

Phytodrip-techniek: het middel voor het planten toepassen door middel van de phytodrip-techniek.

Dosering: 10 ml middel per 1000 planten

ADMIRE O-TEQ kan een invloed hebben op de kiemkracht van het zaad. Behandel daarom geen partijen met een zwakke kiemkracht. Combinatie met andere gewasbeschermingsmiddelen kan dit effect versterken. Hierdoor kan opkomstvertraging en vertraging in de groei van kiemplanten optreden in de opkweek fase.

Spruitkool, ter bestrijding van de koolwittevlieg (*Aleyrodes proletella*)

Traybehandeling: Het middel kort voor het planten aangieten op de tray. Voordat het middel wordt toegediend de planten vochtig maken met 0,2 liter schoon water per m<sup>2</sup> tray. Direct na toepassing (voordat de planten weer aandrogen) de planten afspritzen met 1-2 liter schoon water per m<sup>2</sup> tray.

Dosering: 10 ml middel per 1000 planten

Met ADMIRE O-TEQ behandelde planten kunnen door stress (groeistilstand na overplanten, schraal weer, nachtvorst) bij de eerste hergroei tijdelijk een iets steilere geknepen bladstand laten zien. Ook kan het blad tijdelijk iets geel verkleuren. Dit effect trekt na 2-3 weken weer weg.