



Dringend vereiste toelating van LTO Nederland van het middel **Mesuroi 500 SC**,
toelatingnummer 13029 N

A.
WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT

Toegestaan is uitsluitend het gebruik als insectenbestrijdingsmiddel

- a. in de **productieteelt van prei** met maximaal 2 toepassingen per teelt of teeltseizoen vanaf 1 mei tot en met 30 september 2008
- b. in de **teelt van sluitkool** met maximaal 2 toepassingen per teelt of teeltseizoen vanaf 1 juli tot en met 30 september 2008

Om in het water levende organismen te beschermen mag dit middel in percelen die grenzen aan oppervlaktewater uitsluitend toegepast worden mits binnen een afstand van 14 meter vanaf de insteek van de sloot:

- bij een droge sloot een teeltvrije zone van tenminste 1,5 meter vanaf de insteek van het talud tot de buitenste gewasrij wordt aangehouden bij gebruikmaking van minimaal 90 % driftreducerende doppen;
- bij een watervoerende sloot een teeltvrije zone van tenminste 4 meter vanaf de insteek van het talud tot de buitenste gewasrij wordt aangehouden bij gebruikmaking van minimaal 90% driftreducerende doppen;

Dit middel is gevaarlijk voor bijen. Om bijen te beschermen mag u dit product niet gebruiken op in bloei staande gewassen. Gebruik dit product niet op plaatsen waar bijen actief naar voedsel zoeken. Gebruik dit product niet in de buurt van in bloei staand onkruid.

Dit middel is gevaarlijk voor niet-doelwit-arthropoden. Vermijd onnodige blootstelling.

Dit middel is vergiftig bij opname door de mond. Het is zeer vergiftig voor in water levende organismen en kan in aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.

Het volgende moet daarom in acht worden genomen:

- Draag geschikte beschermende kleding en handschoenen.
- Bij een ongeval of indien men zich onwel voelt, onmiddellijk een arts raadplegen (indien mogelijk hem dit etiket tonen)
- Deze stof en de verpakking als gevaarlijk afval afvoeren.
- Voorkom lozing in het milieu. Vraag om speciale instructies/veiligheidsgegevenskaart.

Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor mens en milieu te voorkomen.

Veiligheidstermijn

De termijn tussen de laatste toepassing en de oogst mag niet korter zijn dan 2 weken voor prei en sluitkool.

Dit middel is uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik.

B.
GEBRUIKSAANWIJZING

Attentie:

Bijen kunnen actief vliegen op niet-bloeiende gewassen, bijvoorbeeld om honingdauw te verzamelen die door luizen is afgescheiden.

Toepassingen

In de productieteelt van prei, ter bestrijding van tabakstrips (*Thrips tabaci*).

Dosering:

Eerste bespuiting: 1,5 liter middel per hectare

Volgbespuiting: 1,0 liter middel per hectare

De bespuiting zonodig éénmaal met een minimale interval van 10 dagen herhalen.

Sluitkool, ter bestrijding van tabakstrips (*Thrips tabaci*).

Dosering:

Eerste bespuiting: 1,5 liter middel per hectare

Volgbespuiting: 1,0 liter middel per hectare

De bespuiting zonodig éénmaal met een minimale interval van 14 dagen herhalen.