

NEDERLANDSE FRUITTELMERS ORGANISATIE

Dringend vereiste toelating van de NFO van het middel **Polisolfuro di Calcio**, toelatingnummer 13033 N

A.

WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT

Toegestaan is uitsluitend het gebruik als schimmelbestrijdingsmiddel met maximaal 10 toepassingen per teelt of teeltseizoen:

- a. in de **biologische teelt van vruchtbomen en onderstammen van appel** vanaf 1 april tot en met 31 mei 2008
- a. in de **biologische teelt van appel** vanaf 15 maart tot en met 30 juni 2008

In verband met het risico voor waterorganismen is de toepassing op percelen die grenzen aan oppervlaktewater uitsluitend toegestaan:

Vóór 1 mei: als gebruik gemaakt wordt van minimaal 70% driftreducerende maatregelen zoals

- een tunnelspuit of
- combinatie windsingel op de rand van het rijpad en éénzijdig bespuiten van de laatste bomenrij, of
- in de eerste 20 meter grenzend aan oppervlaktewater toepassen met venturidop met éénzijdige bespuiting van de laatste bomenrij.

Na 1 mei kan volstaan worden met een driftreductie van tenminste 40% door middel van één van de volgende maatregelen:

- Tunnelspuit
- Windsingel op de rand van het rijpad + éénzijdig bespuiten van de laatste bomenrij
- Sensorgestuurde bespuiting
- Eénzijdig spuiten laatste bomenrij
- Emissiescherm (2,5 m hoog)
- Dwarsstroomspuit met reflectiescherm
- 6 meter teeltvrije zone
- in de eerste 20 meter grenzend aan oppervlaktewater toepassen met venturidop met éénzijdige bespuiting van de laatste bomenrij.

Dit middel is schadelijk voor niet-doelwit arthropoden. Vermijd onnodige blootstelling.

Dit middel vormt giftige gassen in oplossing en is irriterend voor de ogen, ademhalingswegen en de huid.

Het volgende moet daarom in acht worden genomen:

- Buiten bereik van kinderen bewaren.
- Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder.
- Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik.
- Na aanraking met de huid of de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoeien.
- Draag geschikte handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen.
- Draag geschikte ademhalingsbescherming gedurende het legen van de verpakking en het aanmaken van de spuitvloeistof.
- Spuitnevel niet inademen.

Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor mens en milieu te voorkomen.

Veiligheidstermijn:

De termijn tussen de laatste toepassing en de oogst mag niet korter zijn dan 30 dagen.

Dit middel is uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik.

B.
GEBRUIKSAANWIJZING

Algemeen

Het middel kan worden gebruikt als fungicide ter bestrijding van schurft op appel, vruchtbomen en onderstammen van appel in situaties dat een behandeling met zwavel minder effectief is, bijvoorbeeld als het koud is, of als de schurftinfectie reeds tot stand is gekomen.

Toepassing

Biologische teelt van vruchtbomen en onderstammen van appel, ter bestrijding van schurft (*Venturia inaequalis*).

Het middel kan worden toegepast vanaf het verschijnen van de eerste groene delen tot en met mei. De toepassing moet plaatsvinden kort voor of binnen 20 uur na het ontstaan van een schurftinfectie. De toepassing zo nodig herhalen.

Dosering: 15 liter per hectare.

Niet, of in lagere doseringen, gebruiken op zwavelgevoelige rassen, zoals Cox's Orange Pippin en Goudrenet. Niet gebruiken op zoete appels. Kans op schade aan bladeren en vruchtverruwing kan niet worden uitgesloten. Met name bij toepassing onder langzaam drogende omstandigheden, kort voor nachtvorst en bij toepassing bij een temperatuur boven 25 °C.

Biologische teelt van appel, ter bestrijding van schurft (*Venturia inaequalis*).

Het middel kan worden toegepast vanaf het verschijnen van de eerste groene delen tot en met juni. De toepassing moet plaatsvinden kort voor of binnen 20 uur na het ontstaan van een schurftinfectie. De toepassing zo nodig herhalen.

Dosering: 15 liter per hectare.

Niet, of in lagere doseringen, gebruiken op zwavelgevoelige rassen, zoals Cox's Orange, Pippin en Goudrenet. Niet gebruiken op zoete appels. Kans op schade aan bladeren en vruchtverruwing kan niet worden uitgesloten. Met name bij toepassing onder langzaam drogende omstandigheden, kort voor nachtvorst en bij toepassing bij een temperatuur boven 25 °C.

Attentie

- Kalkzwavel heeft een vruchtdunnend effect, indien het middel tijdens de bloei wordt toegepast.
- Het middel niet vermengd met andere bestrijdingsmiddelen of meststoffen verspuiten.