

NEDERLANDSE FRUITTELMERS ORGANISATIE

Dringend vereiste toelating van de NFO van het middel **Spruzit Vloeibaar**, toelatingnummer 13021 N

A.

WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT

Toegestaan is uitsluitend het gebruik als insectenbestrijdingsmiddel met maximaal 2 toepassingen per teelt of teeltseizoen

- a. in de **biologische teelt van appels** vanaf 1 maart tot en met 30 april 2008
- b. in de **biologische teelt van pruimen** vanaf 1 april tot en met 30 juni 2008

Om in het water levende organismen te beschermen mag het middel uitsluitend worden toegepast indien het middel in de eerste 20 meter grenzend aan oppervlaktewater verspoten wordt:

- met een tunnelspuit of
- met een venturidop waarbij de laatste bomerij éénzijdig bespoten dient te worden of
- na 1 mei met een windhaag op de rand van het rijpad en éénzijdig bespuiten van de laatste bomerij

Veiligheidstermijn:

De termijn tussen de laatste toepassing en de oogst voor appel en pruim mag niet korter zijn dan 2 dagen.

Het middel is schadelijk voor niet-doelwit arthropoden. Vermijd onnodige blootstelling.

Het middel is ontvlambaar. Het middel is zeer vergiftig voor in het water levende organismen en kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.

Het volgende moet daarom in acht worden genomen:

- Draag geschikte beschermende kleding en handschoenen.
- Buiten bereik van kinderen bewaren.
- Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder.
- Aanraking met de huid vermijden.
- Afval niet in de gootsteen werpen.

Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor mens en milieu te voorkomen.

Dit middel is uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik.

B.

GEBRUIKSAANWIJZING

Toepassingen

Biologische teelt van appels, ter bestrijding van de appelbloesemkever (*Anthonomus pomorum*). Het gewas dient aan alle kanten goed bespoten te worden. Bespuiting zonodig na een week herhalen. Bij voorkeur overdag, op een zonnige dag spuiten aangezien dan de kevers het meest actief zijn. Niet meer aanmaken dan in een paar uur te verwerken is. Aangemaakte oplossing

niet langdurig blootstellen aan zonlicht en hoge temperaturen.

Dosering: 0,1 % (100 ml op 100 liter water).

Biologische teelt van pruimen, ter bestrijding van de melige pruimenluis (*Hyalopterus pruni*). Het gewas dient aan alle kanten goed bespoten te worden; in het bijzonder de onderkant van het blad. Bespuiting zonodig na een week herhalen. Bij voorkeur 's avonds toepassen voor extra lange werking. Niet meer aanmaken dan in een paar uur te verwerken is. Aangemaakte oplossing niet langdurig blootstellen aan zonlicht en hoge temperaturen.

Dosering: 0,1 % (100 ml op 100 liter water).