

NEDERLANDSE FRUITTELMERS ORGANISATIE

Dringend vereiste toelating van de NFO van het middel **Vertimec**, toelatingnummer 13030 N

A.

WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT

Toegestaan is uitsluitend het gebruik als insectenbestrijdingsmiddel met maximaal 2 toepassingen per teelt of teeltseizoen

a. in de **teelt van peer** door middel van een gewasbehandeling van 1 mei tot en met 31 augustus 2008.

Om in het water levende organismen te beschermen mag dit middel in percelen die grenzen aan oppervlaktewater uitsluitend toegepast worden indien gebruik gemaakt wordt:

- van een tunnelspuit of
- van een combinatie van een windsingel op de rand van het rijpad en éénzijdige bespuiting van de laatste bomenrij of
- van een sensorgestuurde bespuiting of
- van éénzijdig spuiten van de laatste bomenrij of
- van een emissiescherm of
- van een dwarsstroomspuit met reflectiescherm of
- van een 6 meter teeltvrije zone
- indien in de eerste 20 m grenzend aan het oppervlaktewater verspoten wordt met een venturidop waarbij de laatste bomenrij éénzijdig bespoten dient te worden.

Gevaarlijk voor bijen. Om de bijen te beschermen mag u dit product niet gebruiken op in bloei staande gewassen. Gebruik dit product niet op plaatsen waar bijen actief naar voedsel zoeken. Gebruik dit product niet in de buurt van in bloei stand onkruid.

Dit middel is schadelijk bij inademing en opname door de mond. Het middel is irriterend voor de ogen en kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid. Het middel is zeer vergiftig voor in water levende organismen en kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken. Het kan de vruchtbaarheid en het ongeboorn kind schaden.

Het volgende moet daarom in acht worden genomen:

- Draag geschikte beschermende kleding en handschoenen.
- Draag een beschermingsmiddel voor de ogen.
- Spuitnevel niet inademen.
- Bij een ongeval of indien men zich onwel voelt, onmiddellijk een arts raadplegen (indien mogelijk dit etiket tonen).
- Blootstelling vermijden - vóór gebruik speciale aanwijzingen raadplegen.
- Deze stof en de verpakking als gevaarlijk afval afvoeren.
- Voorkom lozing in het milieu. Vraag om speciale instructies/ veiligheidsgegevenskaart.

Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor mens en milieu te voorkomen.

Veiligheidstermijn

De termijn tussen de laatste toepassing en de oogst mag niet korter zijn dan 28 dagen voor peer.

Dit middel is uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik.

B.
GEBRUIKSAANWIJZING

Algemeen

Verspuit het middel onder hoge druk met voldoende water om optimale verdeling over zowel boven- als onderzijde van het blad bereiken. Gebruik minimaal 0,5 liter middel per hectare.

Toepassingen

In de teelt van peer, ter bestrijding van perenbladvlo (*Psylla pyri*).

Toepassen op het moment dat de eerste eieren uitkomen. Vertimec is werkzaam tegen de eerste larvale stadia. Het heeft geen werking tegen de volwassen perenbladvlooiën. De behandeling zonodig na minimaal 10 dagen eenmaal herhalen. De toevoeging van een uitvloeier kan de werking versterken.

Dosering: 0,075% (75 ml per 100 liter water)

Attentie

Gezien de inherente risico's van de ontwikkeling van resistentie tegen enigerlei product wordt sterk aanbevolen Vertimec toe te passen in een goed programma om resistentie tegen te gaan.