



## HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN BESTRIJDINGSMIDDELEN

**BIJLAGE I** bij het besluit d.d. 20 december 2007 tot dringend vereiste toelating van het middel Vertimec, toelatingnummer 13001 N

A.

### WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT

Toegestaan is uitsluitend het gebruik als insectenbestrijdingsmiddel met maximaal 3 toepassingen per teelt of teeltseizoen

- a. in de bedekte zaad- en veredelingsteelt van ui, kool, asperge, wortel, selderij en spinazie van 1 januari tot en met 31 december 2008
- b. In de onbedekte zaad- en veredelingsteelt van ui, kool, asperge, wortel, selderij en spinazie van 1 maart tot en met 31 oktober 2008

In de bedekte teelt mag het middel uitsluitend worden toegepast door middel van:

- een gewasgerichte behandeling met hydraulische spuitapparatuur (hogedrukspuit) mits per hectare minimaal 250 liter spuitvloeistof wordt toegepast met een druk bij de pomp die niet hoger is dan 25 bar (d.d. 2500 kPa of 25 kgf/cm<sup>3</sup> of 25 atm),
- een ruimtebehandeling met een Laag Volume vernevelaar (Low Volume Misters)

Het middel mag uitsluitend worden toegepast onder strikte in achtneming van het gestelde onder veiligheidsaanbevelingen. Het middel mag uitsluitend worden toegepast indien er geen andere personen in de desbetreffende ruimte aanwezig zijn, tenzij deze personen het gestelde onder veiligheidsaanbevelingen strikt in acht nemen.

Dit middel is gevaarlijk voor bijen en hommels. Niet toegestaan is toepassing in bloeiende gewassen of in gewassen wanneer deze actief bezocht worden door bijen of hommels. Niet toegestaan is toepassing wanneer bloeiende onkruiden aanwezig zijn. Gebruik is wel toegestaan op bloeiende planten onder glas mits er geen bijen of hommels in de kas worden gebruikt.

Het middel is schadelijk bij inademing en opname door de mond, irriterend voor de ogen en kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid. Het is zeer vergiftig voor in het water levende organismen en kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken. Het kan de vruchtbaarheid en het ongeboren kind schaden.

Het volgende moet daarom in acht worden genomen:

- Draag geschikte handschoenen en beschermende kleding bij werkzaamheden aan behandeld gewas
- Spuitnevel niet inademen.
- Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen.

- Bij een ongeval of indien men zich onwel voelt, onmiddellijk een arts raadplegen (indien mogelijk dit etiket tonen).
- Blootstelling vermijden- vóór gebruik speciale aanwijzingen raadplegen.
- Deze stof en de verpakking als gevaarlijk afval afvoeren
- Voorkom lozing in het milieu. Vraag om speciale instructies/ veiligheidsgegevenskaart.

Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor mens en milieu te voorkomen.

Dit middel is uitsluitend bestemd voor beroepsmatig gebruik.

## B. GEBRUIKSAANWIJZING

### Algemeen

Verspuit het middel onder hoge druk met voldoende water om optimale verdeling over zowel boven- als onderzijde van het blad te bereiken. Gebruik minimaal 0,5 liter middel per ha. Het is niet nodig om een uitvloeier toe te voegen.

### Toepassingen

De bedekte en onbedekte zaad- en veredelingsteelt van ui, kool, asperge, wortel, selderij en spinazie, ter bestrijding van larven van trips (*Frankliniella occidentalis*, *Thrips tabaci*). Toepassen zodra larven worden waargenomen. De behandeling indien nodig herhalen. Het middel maximaal 3 maal per teelt toepassen met een interval van minimaal 7 dagen.

Dosering: 0,05% (50 ml per 100 liter water) in maximaal 1500 liter water per ha in de bedekte teelt en 0,5 L/ha in de onbedekte teelt.

### Attentie

Gezien de inherente risico's van de ontwikkeling van resistentie tegen enigerlei product wordt sterk aanbevolen Vertimec toe te passen in een goed programma om resistentie tegen te gaan, waaronder begrepen het gebruik van andere producten met andere werkingsmechanismen.