

BIJLAGE I bij het besluit d.d. 7 december 2007 tot dringend vereiste toelating van het middel AZ500, toelatingnummer 12978N

A.
WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT

Toegestaan is uitsluitend het gebruik als onkruidbestrijdingsmiddel met maximaal één toepassing per teelt of teeltseizoen

- a. in de onbedekte pot- en containerteelt van traag groeiende en laagblijvende boomkwekerijgewassen en vaste planten die de pot niet volledig bedekken van 1 december 2007 tot 1 maart 2008.

Het volgende moet in acht worden genomen:

- Om het grondwater te beschermen mag dit product niet worden gebruikt in grondwaterbeschermingsgebieden.
- Om in het water levende organismen te beschermen moeten in de teelt van lage boomkwekerijgewassen driftarme doppen met een driftreductie van minimaal 90% worden gebruikt.
- Niet roken tijdens gebruik
- Spuitnevel niet inademen.
- Aanraking met de huid vermijden.
- Draag geschikte handschoenen.
- Deze stof en de verpakking op veilige wijze afvoeren.
- Voorkom lozing in het milieu. Vraag om speciale veiligheidskaart.

Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor mens en milieu te voorkomen.

Dit middel is uitsluitend bestemd voor beroepsmatig gebruik.

B.
GEBRUIKSAANWIJZING

Algemeen

AZ 500 is een herbicide met een werking tegen diverse éénjarige tweezaadlobbige onkruiden.

AZ 500 bij voorkeur spuiten op natte of vochtige bodems, bij lage temperaturen. De winter- en herfstperiode is het ideale toepassingstijdstip. De hoeveelheid spuitvloeistof bedraagt 100-400 L/ha.

Toepassingen

In de onbedekte pot- en containerteelt van traag groeiende en laagblijvende boomkwekerijgewassen die de pot niet volledig bedekken, ter bestrijding van éénjarige tweezaadlobbige onkruiden. Toepassen tijdens de rustperiode van het gewas en voor opkomst tot kiemlobstadium van het onkruid.

Dosering: 0,5-1 liter AZ 500 per ha werkelijk behandelde oppervlakte

Alleen goed bewortelde boomkwekerijgewassen kunnen behandeld worden. Op zaaibedden mag AZ 500 niet worden toegepast.

In de onbedekte pot- en containerteelt van traag groeiende en laagblijvende vaste planten die de pot niet volledig bedekken, ter bestrijding van éénjarige tweezaadlobbige onkruiden. Toepassen tijdens de rustperiode van het gewas en voor opkomst tot kiemlobstadium van het onkruid.

Dosering: 0,2 liter AZ 500 per ha

Raadpleeg de gevoeligheidslijst van de toelatingshouder betreffende de selectiviteit van AZ 500 in boomkwekerijgewassen en vaste planten. Indien nog geen ervaring in een bepaald gewas is opgedaan met het middel, dient een proefbespuiting uitgevoerd te worden teneinde de verdraagzaamheid van het gewas te testen.