

BIJLAGE I bij het besluit d.d. 1 februari 2008 tot dringend vereiste toelating van het middel Mesurool 500 SC, toelatingnummer 13034 N

A.
WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT

Toegestaan is uitsluitend het gebruik als insectenbestrijdingsmiddel op niet bloeiende gewassen met maximaal 2 toepassingen per teelt of teeltseizoen

- a. in de grondgebonden onbedekte teelt van snijbloemen vanaf 1 maart 2008 tot en met 31 oktober 2008, mits
 - bij een droge sloot een teeltvrije zone van tenminste 1,5 meter vanaf de insteek van het talud tot de buitenste gewasrij wordt aangehouden bij gebruikmaking van minimaal 90 % driftreducerende doppen binnen een afstand van 14 meter vanaf de insteek van de sloot;
 - bij een watervoerende sloot een teeltvrije zone van tenminste 4 meter vanaf de insteek van het talud tot de buitenste gewasrij wordt aangehouden bij gebruikmaking van minimaal 90% driftreducerende doppen binnen een afstand van 14 meter vanaf de insteek van de sloot;
 - het middel niet wordt gebruikt in grondwaterbeschermingsgebieden als bedoeld in de Wet Milieubeheer, met een organische-stofgehalte kleiner dan 2% en meer dan 10% afslibbaar.

Dit middel is gevaarlijk voor bijen. Om de bijen te beschermen mag u dit product niet gebruiken op in bloei staande gewassen. Gebruik dit product niet op plaatsen waar bijen actief naar voedsel zoeken. Gebruik dit product niet in de buurt van in bloei staand onkruid.

Dit middel is gevaarlijk voor niet-doelwit-arthropoden. Vermijdt onnodige blootstelling.

Dit middel is giftig bij opname door de mond, het is zeer vergiftig voor in water levende organismen en kan in aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken. Het volgende moet daarom in acht worden genomen:

- Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen;
- Bij een ongeval of indien men zich onwel voelt, onmiddellijk een arts raadplegen (indien mogelijk dit etiket tonen);
- Deze stof en de verpakking als gevaarlijk afval afvoeren;
- Voorkom lozing in het milieu. Vraag om speciale instructies/veiligheidsgegevenskaart.

Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor mens en milieu te voorkomen.

Dit middel is uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik.

B.
GEBRUIKSAANWIJZING

Algemeen

Bijen kunnen actief vliegen op niet-bloeiende gewassen, bijvoorbeeld om honingdauw te verzamelen die door luizen is afgescheiden.

Toepassingen

Grondgebonden onbedekte teelt van snijbloemen, ter bestrijding van tabakstrips (*Thrips tabaci*) en Californische trips (*Frankliniella occidentalis*).

Bij aanwezigheid van trips een bespuiting toepassen. De bespuiting zonodig herhalen na 7 tot 10 dagen.

Dosering: 0,1 % (100 ml middel per 100 liter water)

Gewasverdraagzaamheid:

Indien nog geen ervaring is opgedaan met het middel, dient een proefbespuiting te worden uitgevoerd, teneinde de gewasverdraagzaamheid van het gewas te testen.