

## HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN BESTRIJDINGSMIDDELEN

**BIJLAGE I** bij het besluit d.d. 20 december 2007 tot dringend vereiste toelating van het middel Previcur N, toelatingnummer 12998 N

### A. WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT

Toegestaan is uitsluitend het gebruik als schimmelbestrijdingsmiddel met maximaal 3 toepassing per teelt of teeltseizoen

- a. in de bedekte grondgebonden teelt van Spaanse pepers van 1 januari tot en met 31 december 2008
- b. In de bedekte teelt van andijvie van 1 september tot en met 31 oktober 2008.

Het volgende moet in acht worden genomen:

- Niet roken tijdens gebruik
- Draag geschikte handschoenen en kleding

Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor mens en milieu te voorkomen.

#### Volgteelt:

In verband met residuen mogen niet binnen 120 dagen na de laatste behandeling wortel-, knol- en bol-consumptiegewassen en niet binnen 60 dagen na de laatste behandeling blad- en stengelgroentegewassen worden geteeld, tenzij middelen op basis van propamocarb in deze gewassen zijn toegelaten.

#### Veiligheidstermijnen:

De termijn tussen de laatste toepassing en de oogst mag niet korter zijn dan 3 dagen voor Spaanse peper en 21 dagen voor andijvie.

Dit middel is uitsluitend bestemd voor beroepsmatig gebruik.

### B. GEBRUIKSAANWIJZING

#### Algemeen

Het middel is een systemisch fungicide met een specifieke werking tegen schimmels, die voetrot en wortelrot veroorzaken, zoals *Pythium*-, *Phytophthora*-, *Peronospora*- en *Aphanomyces*-soorten.

#### Toepassingen

**Grondgebonden bedekte teelt van Spaanse peper**, ter voorkoming van uitval door *Phytophthora*.

Behandeling voor het uitplanten (over de planten in de perspot of op plantenbed)

Dosering: 0,1% (100 ml per 100 liter water). Per m<sup>2</sup> 5 liter spuitvloeistof gebruiken. Naregenen is noodzakelijk om het middel in de wortelzone te laten dringen en van de bladeren af te spoelen.

Behandeling na het uitplanten:

Kort na het uitplanten een behandeling uitvoeren door aangieten van de plantbasis.

Dosering: 0,1% (100 ml per 100 liter water). Per plant 100-150 ml oplossing gebruiken. Indien nodig de behandeling na 2 weken herhalen.

**In de bedekte teelt van andijvie**, ter voorkoming van voetrot.

Behandeling voor het uitplanten (over de planten in de perspot of op plantenbed)

Dosering: 0,1% (100 ml per 100 liter water). Per m<sup>2</sup> 5 liter spuitvloeistof gebruiken. Naregenen is noodzakelijk om het middel in de wortelzone te laten dringen en van de bladeren af te spoelen.

Behandeling na het uitplanten:

Kort na het uitplanten een behandeling uitvoeren door aangieten van de plantbasis.

Dosering: 0,1% (100 ml per 100 liter water). Per plant 100 ml oplossing gebruiken. Indien nodig de behandeling na 2 weken herhalen.