

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN BESTRIJDINGSMIDDELEN

BIJLAGE I bij het besluit d.d. 20 december 2007 tot dringend vereiste toelating van het middel Talstar 8SC, toelatingnummer 12996 N

A.

WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT

Toegestaan is uitsluitend het gebruik als insectenbestrijdingsmiddel met maximaal 1 toepassing per teelt of teeltseizoen

- a. in de onbedekte teelt van zomerbloemen vanaf 1 januari 2008 tot en met 31 december 2008.

Om in het water levende organismen te beschermen moet bij percelen die grenzen aan oppervlaktewater een teeltvrije zone van 150 cm worden toegepast en moeten driftarme doppen met een driftreductie van minimaal 90 % worden gebruikt.

Het middel is schadelijk voor niet-doelwit arthropoden. Vermijd onnodige blootstelling.

Het middel is schadelijk bij inademing en opname door de mond. Carcinogene effecten zijn niet uitgesloten. Het middel is zeer giftig voor in het water levende organismen en kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken. Het volgende moet daarom in acht worden genomen:

- Draag geschikte handschoenen, ook bij werkzaamheden aan behandeld gewas.
- Voor het mengen en laden mag maximaal een hoeveelheid voor een te behandelen oppervlak van 6 ha per dag per persoon aangemaakt worden.

Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor mens en milieu te voorkomen.

Dit middel is uitsluitend bestemd voor beroepsmatig gebruik.

B.

GEBRUIKSAANWIJZING

Toepassingen

In de onbedekte teelt van snijbloemen, ter bestrijding van emelten (larve van *Tipula* spp.).

Als er problemen met emelten verwacht worden, het product verspuiten en inwerken vóór het zaaien of planten.

Dosering: 1,25 liter middel per hectare

Gewasverdraagzaamheid:

Als er geen ervaring is opgedaan met dit middel dient er altijd een proefbehandeling uitgevoerd te worden om de verdraagzaamheid van het gewas te testen.