

AgriChem Metamitron 700

TOELATINGSNUMMER : 11503 N W1
AARD VAN HET PREPARAAT : SUSPENSIE CONCENTRAAT
WERKZAME STOF : 4-amino-3-methyl-6-fenyl-
1,2,4-triazine-5-on (METAMITRON)
GEHALTE : 700 G/L
UN 3082



EEN ONKRUIDBESTRIJDINGSMIDDEL O.A. IN TEELT VAN SUIKERBIETEN

WAARSCHUWINGSZINNEN

- Schadelijk bij opname door de mond.
- Zeer vergiftig voor in het water levende organismen.

VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN

- Draag geschikte handschoenen en beschermende kleding, ook bij werkzaamheden aan behandeld gewas.
- In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen.
- Voorkom lozing in het milieu. Vraag om speciale instructies/veiligheidskaart.

Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor mens en milieu te voorkomen.

WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT

Toegestaan is uitsluitend het gebruik als onkruidbestrijdingsmiddel in de teelt van:

1. suikerbieten, voederbieten en krotten;
2. bloembollen en bolbloemen.

Gebruik van dit middel in grondwaterbeschermingsgebieden als bedoeld in de Wet bodembescherming, daaronder niet begrepen de gebieden waarbinnen uitsluitend fysische bodemaantastingen zoals grondboringen zijn verboden, is niet toegestaan op gronden met een organisch stofgehalte minder dan 2% en minder dan 10% afslibbaar.

Deze verpakking is bedrijfsafval, mits deze is schoongespoeld zoals wettelijk is voorgeschreven.
Hergebruik van deze verpakking is niet toegestaan.

GEBRUIKSAANWIJZING

Algemeen

AGRICHEM METAMITRON 700 is een systemisch onkruidbestrijdingsmiddel dat voornamelijk via de wortels wordt opgenomen. Het is werkzaam tegen éénjarige onkruiden. Ongevoelig zijn wilde haver, hanenpoot, bingelkruid en wortelonkruiden.

TOEPASSINGEN

Suiker- en voederbieten

In toepassingen voor de opkomst van de bieten werkt AGRICHEM METAMITRON 700 als bodemherbicide. Bij na-opkomsttoepassingen is AGRICHEM METAMITRON 700, vooral in combinatie met plantaardige of minerale olie of met fenmedifam werkzaam als bladherbicide en als bodemherbicide. Op humeuze grondsoorten gaat de voorkeur uit naar uitsluitend na-opkomsttoepassingen.

AgriChem bv,
industrieterrein weststad
Koopvaardijweg 9 - 4906 CV Oosterhout (Nederland)
Postbus 295 - 4900 AG Oosterhout (Nederland)
Telefoon: 0162-431931 Telefax: 0162-456797
E-mail: info@agrichem.com Webpage: www.agrichem.info



AgriChem Metamitron 700 (vervolg)

TOELATINGSNUMMER : 11503 N W1
AARD VAN HET PREPARAAT : SUSPENSIE CONCENTRAAT
WERKZAME STOF : 4-amino-3-methyl-6-fenyl-
1,2,4-triazine-5-on (METAMITRON)
GEHALTE : 700 G/L
UN 3082



Schadelijk



Milieu-
gevaarlijk

Toepassingstijdstippen:

I Bij zaaien

Als preconditionering voor na-opkomsttoepassingen, onder andere als kamille wordt verwacht. Bij een rijenbehandeling worden de volgende doseringen aanbevolen:

dosering per ha: op klei-, zavel- en lössgronden
tot 20% slib 4 ltr
20-35% slib 5 ltr
boven 35% slib 6 ltr
op andere gronden 2-3 ltr

II Kort na zaaien tot enkele dagen voor opkomst van de bieten

Als preconditionering voor na-opkomsttoepassingen, onder andere als kamille wordt verwacht.
dosering per ha: 2-3 ltr

III Na opkomst van de bieten

Ter versterking van de bladwerking en verbreding van het werkingsspectrum wordt een tankmenging geadviseerd.

Tijdstip

Dosering per ha

Als de eerste onkruiden opkomen

2 ltr + 2 ltr minerale olie

Als de bieten gestrekte kiemlobben hebben ontwikkeld

1,5 ltr + 3 ltr fenmedifam (157 g/l)

Deze toepassing zonodig herhalen zodra de bieten 2 echte blaadjes volledig hebben ontwikkeld.

Als de eerste twee echte blaadjes van de bieten ca. 1 cm groot zijn en nog niet in eerdere stadia van de bieten metamitron werd toegepast

3 ltr + 3 of 5 ltr fenmedifam, de hoogste dosering fenmedifam toepassen als zwaluwtong of varkensgras of kleefkruid voorkomt

(noodmaatregel)

Na het sluiten van de bieten tegen ontsnapte grote onkruiden

3 ltr + 5 ltr minerale olie

Op zeer jonge onkruiden in kiembladstadium: (onafhankelijk van het stadium van de bieten)

0,5 ltr + 0,5 ltr ethofumesaat (200 g/l)
+ 0,5 ltr fenmedifam (157 g/l)
+ 0,5 ltr minerale olie

Waarschuwing

Voor een optimaal en veilig gebruik van AGRICHEM METAMITRON 700 en de combinaties met fenmedifam, ethofumesaat of olie dienen de volgende regels in acht te worden genomen.

- De bovenstaande advisering aanhouden, geen olie toevoegen als dit niet vermeld is. De kans op gewasschade is dan te groot.

AgriChem bv,
industrieterrein weststad

Koopvaardijweg 9 - 4906 CV Oosterhout (Nederland)

Postbus 295 - 4900 AG Oosterhout (Nederland)

Telefoon: 0162-431931

Telefax: 0162-456797

E-mail: info@agrichem.com

Webpage: www.agrichem.info



AgriChem Metamitron 700 (vervolg)

TOELATINGSNUMMER : 11503 N W1
AARD VAN HET PREPARAAT : SUSPENSIE CONCENTRAAT
WERKZAME STOF : 4-amino-3-methyl-6-fenyl-
1,2,4-triazine-5-on (METAMITRON)
GEHALTE : 700 G/L
UN 3082



Schadelijk



Milieu-
gevaarlijk

- Aan de combinaties van AGRICHEM METAMITRON 700 met olie of met fenmedifam kunnen geen insecticiden worden toegevoegd.
- Niet toepassen indien nachtvorst verwacht wordt of in een periode met temperaturen boven 25°C.
- Bij temperaturen overdag tussen 20-25°C dient de bespuiting bij voorkeur in de avonduren uitgevoerd te worden.
- De selectiviteit van de aanbevolen toepassingen van AGRICHEM METAMITRON 700 in bieten is groot.
De verdraagzaamheid van bieten neemt echter af, wanneer het gewas te lijden heeft van ongunstige groeiomstandigheden ten gevolge van b.v. nachtvorst, extreme temperatuurschommelingen, hagel, verslumping van de grond, hoge zoutconcentratie, insectenvraat en schimmelaantastingen.

Nateelt

Mislukt een bietengewas door welke oorzaak dan ook, dan kunnen na een toepassing van AGRICHEM METAMITRON 700 zonder grondbewerking weer bieten of krotten worden ingezaaid. Maïs en aardappelen kunnen worden geteeld nadat de grond is geploegd.

Krotten

AGRICHEM METAMITRON 700 toepassen als bij suiker- en voederbieten, kort na zaaien en/of in combinatie met fenmedifam na de opkomst van het gewas. Bij toepassing in een teelt waarbij hetzelfde kalenderjaar nog een volgteelt geteeld wordt, uitsluitend een éénmalige bespuiting met AGRICHEM METAMITRON 700 uitvoeren: of vóór de opkomst of na de opkomst van het gewas.

Bloembollen en bolbloemen

Tulpen

AGRICHEM METAMITRON 700 toepassen in het voorjaar vanaf de opkomst voor het spreiden van het gewas (0-4 cm).

Spuiten op onkruidvrije en enigszins vochtige grond.

Dosering per ha: 3 ltr

In tulpen zijn een aantal cultivars gevoelig voor de werkzame stof metamitron.

Zie hiervoor de adviezen van de voorlichtingsdienst.

Irissen

Chloorprofam wordt enkele dagen na het verwijderen van het stro toegepast.

Ca. 14 dagen later wordt AGRICHEM METAMITRON 700 verspoten.

Dosering per ha: 3 ltr

AgriChem bv,
industrieterrein weststad

Koopvaardijweg 9 - 4906 CV Oosterhout (Nederland)

Postbus 295 - 4900 AG Oosterhout (Nederland)

Telefoon: 0162-431931

Telefax: 0162-456797

E-mail: info@agrichem.com

Webpage: www.agrichem.info



AgriChem Metamitron 700 (vervolg)

TOELATINGSNUMMER : 11503 N W1
AARD VAN HET PREPARAAT : SUSPENSIE CONCENTRAAT
WERKZAME STOF : 4-amino-3-methyl-6-fenyl-
1,2,4-triazine-5-on (METAMITRON)
GEHALTE : 700 G/L
UN 3082



Schadelijk



Milieu-
gevaarlijk

Narcissen

AGRICHEM METAMITRON 700 toepassen bij een gewaslengte van 5-10 cm.

Dosering per ha: 3 ltr

Lelies

AGRICHEM METAMITRON 700 toepassen rond de opkomst van het gewas.

Dosering per ha: 3 ltr

Wanneer na de opkomst van de lelies onkruiden voorkomen kan een bespuiting met AGRICHEM METAMITRON 700 + minerale olie worden uitgevoerd, zodra deze onkruiden verschijnen. Indien nodig kan deze bespuiting worden herhaald.

Dosering per ha: 3 ltr AGRICHEM METAMITRON 700 + 5 ltr minerale olie

Lelies onder glas

AGRICHEM METAMITRON 700 toepassen zolang de sprouiten nog gesloten en maximaal 10 cm hoog zijn. Tegen de avond sprouiten met 5 ltr water per are op een droog gewas en de volgende morgen afbroezelen. AGRICHEM METAMITRON 700 maximaal 2 maal per jaar toepassen. Geen groentegewassen natelen.

Dosering: 20 ml/are

Indien gemengd met een ander in deze teelt toegelaten onkruidbestrijdingsmiddel kan de dosering verlaagd worden tot 10 ml/are. Zie hiervoor ook de adviezen van de voorlichtingsdienst.

Andere bloembolgewassen

In andere bloembolgewassen is weinig of geen ervaring opgedaan. Een deel van het sortiment verdraagt AGRICHEM METAMITRON 700, een ander deel niet. Informeer dus, voordat u gaat sprouiten, bij de voorlichtingsdienst of de fabrikant.

N.B. Voor alle toepassingen in bloembollen geldt:

- Indien geen ervaringen bekend zijn, dient de teler zelf door het uitvoeren van een kleine proefbespuiting te onderzoeken of het middel wordt verdragen.
- AGRICHEM METAMITRON 700 niet toepassen op spuituinen en diep geploegde zandgronden.
- Sprouiten op een droog gewas en niet kort na of kort voor nachtvorst.
- Op de dag van sprouiten moet het droog weer zijn.
- Op zavel- en kleigronden met meer dan 20% slib en 2% humus wordt de bodemwerking van AGRICHEM METAMITRON 700 wisselvallig.

NOTA:

Voor schade voortvloeiende uit vervoer, opslag en gebruik van onze producten, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden.

AgriChem bv,
industrieterrein weststad

Koopvaardijweg 9 - 4906 CV Oosterhout (Nederland)

Postbus 295 - 4900 AG Oosterhout (Nederland)

Telefoon: 0162-431931

Telefax: 0162-456797

E-mail: info@agrichem.com

Webpage: www.agrichem.info

