



## Fungicide

Tegen schimmels in de bedekte teelt van courgette, komkommer, tomaat, bloemisterijgewassen, boomkwekerij en vaste planten.

1 L

Toelatingsnr.:  
11463 N

W4

Altijd uitvloeier  
toevoegen

Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor mens en milieu te voorkomen.

Aard van het preparaat: Vloeistof

Toelatingsnummer: 11463 N - W4

Werkzame stof: Bitertanol  
Gehalte: 500 g/l

### Waarschuwingzinnen

Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid.  
Vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.

### Veiligheidsaanbevelingen

Draag geschikte handschoenen en beschermende kleding, ook bij werkzaamheden aan behandeld gewas.  
Voorkom lozing in het milieu. Vraag om speciale instructies/veiligheidskaart.

**Verkoop alleen toegestaan in onze ongeopende verpakking.**

**Droog en achter slot bewaren.**

**Verpakking mag niet opnieuw worden gebruikt.**

**Bewaren boven -10° C.**



Irriterend



Milieugevaarlijk

**STORL**  
VERPAKKING

Deze verpakking is bedrijfsafval, mits deze is schoongespoeld zoals wettelijk is voorgeschreven.



UN 3082

Toelatingshouder:  
Bayer CropScience B.V.  
Postbus 231  
3640 AE Mijdrecht  
Tel. 0297-280618

zie verpakking  
03588487 Sales-Met.

 Bayer CropScience



## EERSTE HULP MAATREGELEN

### Algemene aanbevelingen

Buiten de gevaarlijke zone brengen. Ligging en vervoer in stabiele zijligging.

### Inademing

In de frisse lucht brengen. Het slachtoffer warm en rustig houden.

Onmiddellijk een arts of Vergiftigingen Informatie Centrum verwittigen.

### Contact met de huid

Met veel water en zeep afwassen, indien voor handen, met veel polyethyleenglykol 400. Vervolgens reinigen met water.

### Contact met de ogen

Eventueel aanwezige contactlenzen pas na 5 minuten verwijderen. Daarna de oogspoeling weer voortzetten.

### Inslikken

GEEN braken opwekken. Mond spoelen. Onmiddellijk een arts of Vergiftigingen Informatie Centrum verwittigen.

### Wettelijk gebruiksvoorschrift

Toegestaan is uitsluitend het gebruik als schimmelbestrijdingsmiddel:

- a. in de teelten onder glas van courgette, komkommers en tomaten;
- b. in de teelt onder glas van bloemisterijgewassen;
- c. in de teelt onder glas van boomkwekerijgewassen en vaste planten.

Dit middel heeft een negatief effect op *Verticillium Lecanii*. Vermijd onnodige blootstelling.

Om in het water levende organismen te beschermen is de toepassing in percelen die grenzen aan oppervlaktewater uitsluitend toegestaan indien gebruik wordt gemaakt van een maximale frequentie van viermaal per teeltseizoen.

### Veiligheidstermijnen

De termijn tussen de laatste toepassing en de oogst mag niet korter zijndan 3 dagen voor courgettes, komkommers en tomaten.

## GEBRUIKSAANWIJZING

### Algemeen

Bij de behandeling alle delen van het gewas goed raken. Het middel is lokaal systemisch.

Het verdient aanbeveling middels een proefbespuiting vast te stellen of het te behandelen gewas het middel verdraagt.

### Attentie:

Het middel is giftig voor waterorganismen, daarom zodanig toepassen dat het middel niet in oppervlaktewater terecht komt.

Bij verpleeg- en oogstbehandelingen in met Baycor Flow behandelde gewassen moeten beschermende handschoenen gedragen worden.

### Toepassingen:

**Courgettes en komkommers**, ter bestrijding van meeldauw (*Sphaerotheca tusca*).

Zodra aantasting wordt waargenomen een behandeling uitvoeren. De behandeling enige malen herhalen met intervallen van 5–7 dagen. In verband met kans op schade niet in de wintermaanden toepassen.

**Dosering:** 0,06% (60 ml per 100 liter); **er dient een uitvloeier bijv. Motto®** te worden toegevoegd.

**Courgettes en komkommers**, ter bestrijding van bladverkleuringsziekte (*Didymella bryoniae* = *Mycosphaerella citrullina*). Zodra aantasting wordt waargenomen een behandeling uitvoeren. De behandeling enige malen herhalen met intervallen van 5–7 dagen. In verband met kans op schade niet in de wintermaanden toepassen.

**Dosering:** 0,06% (60 ml per 100 liter); **er dient een uitvloeier bijv. Motto®** te worden toegevoegd.

**Tomaten**, ter bestrijding van echte meeldauw (*Oidium lycopersicum*). Zodra aantasting wordt waargenomen een behandeling uitvoeren. De behandeling enige malen herhalen met intervallen van 5–7 dagen. In verband met kans op schade niet in de wintermaanden toepassen. Bij gebruik van het middel in andere seizoenen kunnen donkere bladpuntjes ontstaan die echter geen invloed hebben op de productie.

**Dosering:** 0,06% (60 ml per 100 liter water); **er dient een uitvloeier bijv. Motto®** te worden toegevoegd.

**Bloemisterijgewassen**, ter bestrijding van meeldauw (*Erysiphaceae* en *Oidium spp.*). Zodra aantasting wordt waargenomen een behandeling uitvoeren. De behandeling enige malen herhalen met intervallen van 5–7 dagen. Bij chrysanten werkt het middel, voor zover er geen resistentie aanwezig is, bij regelmatige toepassing ook tegen Japanse roest (*Puccinia horiana*).

**Dosering:** 0,09% (90 ml per 100 liter water); **er dient een uitvloeier bijv. Motto®** te worden toegevoegd.

**Pelargonium**, ter bestrijding van roest (*Puccinia pelargonizonalis*).

Zodra aantasting wordt waargenomen een behandeling uitvoeren. De behandeling enige malen herhalen met intervallen van 5–7 dagen.

**Dosering:** 0,12% (120 ml per 100 liter water); **er dient een uitvloeier bijv. Motto®** te worden toegevoegd.

**Boomkwekerijgewassen en vaste planten**, ter bestrijding van meeldauw (*Erysiphaceae* en *Oidium spp.*).

Zodra aantasting wordt waargenomen een behandeling uitvoeren. De behandeling enige malen herhalen met intervallen van 5–7 dagen.

**Dosering:** 0,09% (90 ml per 100 liter water); **er dient een uitvloeier bijv. Motto®** te worden toegevoegd.

### **Veiligheidsaanbevelingen bij herbetreding**

Na een gewas- of ruimtebehandeling uitsluitend herbetreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd (en de kas gedurende 2 uur geventileerd is).

Tijdens gewaswerkzaamheden en oogsten/snijden gedurende 14 dagen na de toepassing geschikte beschermende kleding en handschoenen dragen.

Tijdens sorteren en verpakken geschikte handschoenen en lange mouwen dragen indien binnen 14 dagen na de toepassing is geoogst.

### **Gevoeligheid gewassen**

Gezien het grote aantal variëteiten en de wisselende teeltomstandigheden van bloemisterijgewassen, boomkwekerijgewassen, vaste planten en groenteteeltgewassen is het onmogelijk de gewasverdraagzaamheid voor alle gevallen te onderzoeken.

De gebruiker van dit product zal, wanneer met een cultivar in een groeistadium of onder bepaalde omstandigheden nog geen ervaring is opgedaan, zelf proefsgewijze een bespuiting moeten uitvoeren om verantwoordelijkheid voor de gewasverdraagzaamheid te kunnen nemen.

Wij kunnen daarom geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade door toepassing van dit product in hiergenoemde teelten.

### **Verminderde werking**

Het kan niet worden uitgesloten, dat minder gevoelige schimmelfysio's kunnen voorkomen. Onder ongunstige omstandigheden kan de werking daardoor afnemen. Doordat een groot aantal factoren invloed uitoefent op het ontstaan van dergelijke fysio's, is het optreden hiervan niet te voorspellen.

De handelsnaam Motto® is eigendom van BASF B.V.

Deze gebruiksaanwijzing is opgesteld volgens de laatste inzichten. De gegevens over eigenschappen en toepassingen van onze producten beantwoorden aan de -na zorgvuldig onderzoek - opgedane ervaringen.

Veel factoren buiten de invloed van Bayer CropScience zoals ondermeer opslag, vervoer, de wijze van toepassing, de teeltwijze, de dosering etc. kunnen de werking van het product beïnvloeden, zodat Bayer CropScience in verband hiermee geen enkele aansprakelijkheid kan accepteren. Overigens zijn onze Algemene Verkoopvoorwaarden van kracht.



**BAYCOR  
flow**

Toelatingsnr.:  
11463 N

W4

icide

schimmels in de bedekte  
n courgette, komkom-  
maat, bloemisterij-  
sen, boomkwekerij en  
planten.

itvloei-  
voegen

**Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor mens en milieu te voorkomen.**

**Aard van het preparaat: Vloeistof**

**Toelatingsnummer: 11463 N - W4**

**Werkzame stof: Bitertanol**  
**Gehalte: 500 g/l**

**Waarschuwingzinnen**

Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid.  
Vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.

**Veiligheidsaanbevelingen**

Draag geschikte handschoenen en beschermende kleding, ook bij werkzaamheden aan behandeld gewas.  
Voorkom lozing in het milieu. Vraag om speciale instructies/veiligheidskaart.

**Verkoop alleen toegestaan in onze ongeopende verpakking.**

**Droog en achter slot bewaren.**

**Verpakking mag niet opnieuw worden gebruikt.**

**Bewaren boven -10° C.**



Irriterend



Milieugevaarlijk

**STORL**  
**VERPAKKING**

Deze verpakking is bedrijfsafval, mits deze is schoongespoeld zoals wettelijk is voorgeschreven.



UN 3082

**Toelatingshouder:**  
Bayer CropScience B.V.  
Postbus 231  
3640 AE Mijdrecht  
Tel. 0297-280618

zie verpakking  
03588487 Sales-Met.



Bayer CropScience

NL79437315B

