



# Mesuroi 500 SC

toelatingsnr.: 11720 N W6

## Insecticide

Insecticide in niet-grondgebonden teelten van meloenen, komkommers, bloembollen, bolbloemen en bloemisterijgewassen.

### EERSTE HULP MAATREGELEN

#### Inhalatie

In de frisse lucht brengen na per ongeluk inademen van dampen of van ontledingsproducten. Indien nodig zuurstof of kunstmatige ademhaling toedienen. Onmiddellijk een arts of Vergiftigingen Informatie Centrum verwittigen.

#### Contact met de huid

Met zeep en water wassen. Verontreinigde kleding en schoenen onmiddellijk uittrekken. Onmiddellijk een arts of Vergiftigingen Informatie Centrum verwittigen.

#### Contact met de ogen

Onmiddellijk met veel water spoelen, ook onder de oogleden, gedurende tenminste 15 minuten. Eventueel aanwezige contactlenzen pas na 5 minuten verwijderen. Daarna de oogspoeling weer voortzetten. Medische hulp inroepen als irritatie optreedt en aanhoudt.

#### Inslukken

Mond spoelen. Braken opwekken, alleen als: 1. patient bij vol bewustzijn is, 2. medische hulp niet snel bereikbaar is, 3. een grotere hoeveelheid ingeslikt is, en 4. tijd sinds inslikken minder dan één uur bedraagt. (Braaksel mag niet in luchtpijp terecht komen.) Onmiddellijk een arts of Vergiftigingen Informatie Centrum verwittigen.

#### WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT

Toegestaan is uitsluitend het gebruik als insectenbestrijdingsmiddel:

- In de niet-grondgebonden bedekte teelten van komkommer, met dien verstande dat niet meer dan 1000 L water per ha gebruikt dient te worden en uitsluitend toepassen nadat de laatste vruchten van de teelt zijn geoogst;
- In de niet-grondgebonden bedekte teelten van meloen, met dien verstande dat bij toepassing in de teelt van meloen niet meer dan 1000 L water per ha gebruikt dient te worden;
- In niet-grondgebonden bedekte teelten van bloembollen en bolbloemen;
- In grondgebonden bedekte teelten van bolbloemen; en in bedekte teelten van bloemisterijgewassen.

Dit middel is schadelijk voor niet-doelwit arthropoden. Vermijd onnodige blootstelling.

Voor de grondgebonden teelten is toepassing van het middel enkel toegestaan in kassen, die voorzien zijn van drainagesystemen voor de opvang en recirculatie van uitgespoeld water én wanneer de bodem wordt gestoofd.

Dit middel is gevaarlijk voor bijen en hommels. Niet toegestaan is toepassing in bloeiende gewassen of in gewassen wanneer deze actief bezocht worden door bijen of hommels. Niet toegestaan is toepassing wanneer bloeiende onkruiden aanwezig zijn.

#### Veiligheidstermijnen:

De termijn tussen de laatste toepassing en de oogst mag niet korter zijn dan **3 dagen** voor **meloenen**.

Dit middel is uitsluitend bestemd voor beroepsmatig gebruik.

#### GBRUIKSAANWIJZING

##### Attentie:

Bijen kunnen actief vliegen op niet-bloeiende gewassen, bijvoorbeeld om honingdauw te verzamelen die door luizen is afgescheiden.

##### Toepassingen

Komkommer, alleen nadat de laatste vruchten geplukt zijn, maximaal één toepassing ter bestrijding van Californische trips (*Frankliniella occidentalis*) en katoenluis (*Aphis gossypii*). Het middel heeft een nevenwerking tegen spint (*Tetranychus urticae*). **Dosering:** 0,1% (100 ml per 100 liter water). Niet meer dan 1000 L water/ha gebruiken.

**Meloen**, ter bestrijding van Californische trips (*Frankliniella occidentalis*) en katoenluis (*Aphis gossypii*). Een behandeling uitvoeren zodra aantasting wordt waargenomen. De behandeling met een interval van een week enkele malen herhalen. Het middel heeft een nevenwerking tegen spint (*Tetranychus urticae*). **Dosering:** 0,1% (100 ml per 100 liter water). Bij komkommer en meloen niet meer dan 1000 L water/ha gebruiken.

**Bloembollen en bolbloemen** ter bestrijding van Californische trips (*Frankliniella occidentalis*), gladiolentrips (*Taeniothrips*) en katoenluis (*Aphis gossypii*).

Een behandeling uitvoeren zodra aantasting wordt waargenomen. De behandeling met een interval van een week enkele malen herhalen.

Het middel heeft een nevenwerking tegen spint (*Tetranychus urticae*). **Dosering:** 0,1% (100 ml per 100 liter water).

**Bloemisterijgewassen** ter bestrijding van Californische trips (*Frankliniella occidentalis*) en katoenluis (*Aphis gossypii*).

Een behandeling uitvoeren zodra aantasting wordt waargenomen. De behandeling met een interval van een week enkele malen herhalen.

### Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor mens en milieu te voorkomen

**Aard van het Preparaat:** suspensie concentraat

**Werkzame stof:** methiocarb

**Gehalte:** 500 g/l

**Toxicologische groep:** carbamaat met cholinesterase-remmende werking.

#### Waarschuwingzinnen:

Vergiftig bij opname door de mond.

Zeer vergiftig voor in het waterlevende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.

#### Veiligheidsaanbevelingen

Draag geschikte handschoenen en beschermende kleding, ook bij werkzaamheden aan behandeld gewas. Bij een ongeval of indien met zich onwel voelt, onmiddellijk een arts raadplegen (indien mogelijk hem dit etiket tonen). Voorkom lozing in het milieu. Vraag om speciale instructies/veiligheidsgegevenskaart.

**STORL**  
VERPAKKING



UN 2992

**Toelatingshouder:**  
Bayer CropScience B.V.  
Postbus 231  
3640 AE Mijdrecht  
Tel. 0297-280618

Partijnr./Productiedatum:  
zie verpakking  
Stand: 21-09-2007  
03590325 Sales-Mat.



Vergiftig



Milieugevaarlijk



NL79096683D

4 000680 034278