

# STABILAN<sup>®</sup>

## CCC

### LINZ 750 SL

Groeieregulator voor de teelt van tarwe en in bloemgisterijgewassen.

Toelatingsnummer: 8828 N

Aard van het preparaat: met water mengbaar  
concentraat

Werkzame stof: chloormequat

Gehalte: 750 g/L

Lotnummer: zie verpakking

W.2

Xn



SCHADELIJK

#### Bijzondere gevaren

R22 Schadelijk bij opname door de mond.

#### Veiligheidsaanbevelingen

S21 Niet roken tijdens gebruik.

S36/37d-NL Draag geschikte handschoenen en beschermende kleding ook bij werkzaamheden aan behandeld gewas.

S46 In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen.

Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor mens en milieu te voorkomen.

Deze verpakking mag niet opnieuw worden gebruikt.  
Lees altijd voor het gebruik het gehele etiket.

© = Gedeponoerd handelsmerk  
Nufarm.

**STORL**  
VERPAKKING

Deze verpakking is bedrijfsafval,  
mits deze is schoongespoeld  
zoals wettelijk is voorgeschreven.



4 260100 288326

Toelatingshouder  
NUFARM GmbH & Co KG  
St.-Peter-Strasse 25  
A-4021 Linz, Austria  
Tel.: 0043-732 691 80

21055/1107/NL/VS

# 10L

Nufarm b.v.  
Welplaatweg 12  
3197 KS Botlek, Rotterdam  
Tel.: 010-4389838



# STABILAN®

## Wettelijk Gebruiksvoorschrift

Toegestaan is uitsluitend het gebruik als groeiregulator:

- a. in de teelt van tarwe, mits toegepast voor het zichtbaar worden van de aren;
- b. in de teelt van bloemisterijgewassen.

## Gebruiksaanwijzing

### Toepassingen

#### Tarwe

- Werking en doel Stabilan® verkort op het vroege toepassingstijdstip vooral de onderste stengelleden; bij een latere toepassing vooral de hoger gelegen stengelleden.

De stengel wordt steviger, waardoor minder snel legering optreedt.

Er is verschil in rasgevoeligheid.

- Tijdstip van toepassing en dosering:

Toepassen - tegen legeringsgevaar ten gevolge van een te zwaar tarwegewas of voetziekte - bij voorkeur einde uitstoeling (stadium 5 volgens de Feekesschaal). Toepassen na begin schieten is mogelijk, doch verhoogt de kans op het optreden van afrijpingsziekten. Zodra de eerste aren zichtbaar zijn mag het middel in geen geval meer worden toegepast.

Dosering:

wintertarwe: 0,5 - 1 liter per ha;

zomertarwe: 0,5 liter per ha.

Opmerkingen

Het middel op zand- en dalgronden alleen toepassen bij grote kans op legering. Het middel niet toepassen op een licht gewas of op droogtegevoelige gronden.

Ondervruchten ondervinden geen schade van de toepassing.

Na de bespuiting is 1 à 2 uur droog weer gewenst.

## Bloemisterijgewassen

### Hibiscus

Ter verkrijging van meer gelijkmatig groeiende planten.

De beste resultaten worden verkregen bij toepassing op het moment, waarop de scheuten gemiddeld 5 - 6 cm lang zijn.

Dosering: spuiten met ten hoogste 1 ml middel per 10 liter water.

Uitvloeier toevoegen.

### Poinsettia

Ter verkrijging van groeiremming.

- In jaarrondculturen 2x spuiten met 15 ml per 10 liter water. Uitvloeier toevoegen. De eerste bespuiting kan het best worden uitgevoerd bij aanvang van de kortedagbehandeling, de tweede een week later.

- Voor in natuurlijke dag geteelde planten zijn vanaf half augustus drie, vanaf september twee bespuitingen toereikend ter verkrijging van voldoende korte planten. Dosering: 15 ml per 10 liter water

### Lilium M.C. Hybride "Enchantment"

Ter verkrijging van groeiremming, uitsluitend in potplantencultuur.

Tijdstip: op moment dat de spruit boven de grond komt.

Dosering: per pot 25 ml toedienen van een oplossing, die per liter water 125 ml Stabilan® bevat.

### Azalea indica

Ter bevordering van de bloemknopeaanleg.

Tijdstip: Het meest geschikte tijdstip van toepassing is het moment, waarop bloemknoppen worden aangelegd.

Dosering: 1 à 2 maal spuiten (± een maand tussenruimte) met 15 ml per 10 liter water. Uitvloeier toevoegen.

### Pelargonium zonale F1-hybriden

Ter verkrijgen van bloeivervroeging en groeiremming.

Tijdstip: als de planten vier geheel volgroeide bladeren hebben, gevolgd door een tweede bespuiting 1 tot 2 weken na de eerste.

Dosering: spuiten met 15-22,5 ml Stabilan® op 10 liter water, waaraan uitvloeier is toegevoegd.

## Bereiding van de spuitoplossing

Het product in de voor 1/2 gevulde spuittank gieten. Mengten en verder al mengende met water aanvullen.

## Voorzorgsmaatregelen

Onmiddellijk na de bespuiting, het toestel grondig met water reinigen.

Dit product in een originele gesloten verpakking en vorstvrij bewaren, in een frisse, droge en afgesloten ruimte, die speciaal daarvoor bestemd is.

## Waarborg

Wij garanderen dat de samenstelling van de producten in gesloten, originele verpakkingen gelijk staat aan de indicaties aangegeven op de etiketten. Aangezien de opslag en het gebruik buiten onze invloed liggen, nemen wij geen verantwoordelijkheid voor directe of indirecte gevolgen n.a.v. foutief gebruik van de producten of gebruik in strijd met de voorschriften. Meerdere factoren, zoals weer, bodem, plantensoort, toepassingstechnieken, toepassingstermijn, resistentie, menging met andere producten, enz. kunnen invloed op de werking van het product hebben. Dit kan, onder ongunstige omstandigheden, een verandering van de effectiviteit van het product tot gevolg hebben of aanleiding zijn voor schade aan het gewas. Voor deze resultaten kunnen de distributeurs en de producenten geen verantwoording nemen.