

TOMMI



De referentie van de Belgische en Duitse molens!

OORSPRONG

Kweker: Nordsaat - D
Kruising: (Astron x Ralf) x Heaven
Duitse rassencatalogus

KENMERKEN

Type: lang, onbebaard
Vroegrijpheid: halfvroeg
Legervastheid: goed
Wintervastheid: goed
Uitstoeling: matig

ZIEKTERESISTENTIE

Voetziekten: goed
Meeldauw: zeer goed
Gele roest: zeer goed
Bruine roest: gevoelig
Bladseptoria: goed
Aarfusarium: zeer goed
Aarseptoria: goed

KWALITEIT

TOMMI heeft een superieure bakkwaliteit. In Duitse en Belgische proeven werden zeer hoge waarden genoteerd voor de verschillende kwaliteitsparameters. Analyses van de oogst 2008 laten eenzelfde beeld zien. TOMMI bevestigt zich als hoogwaardige baktarwe met eiwitgehaltes tussen 12 en 14%, Zeleny-waarden > 45 en hectolitergewichten hoger dan 80.

CULTUURTECHNIEK

Zaai

Van begin oktober tot half december. Rekening houdend met de sterke ontwikkeling van de primaire halm ten nadele van de secundaire halmen wordt best aan een hoge dichtheid gezaaid. Bij zaai tussen half oktober en begin november dienen reeds 350 korrels/m² te worden gezaaid. Nadien worden best 400 à 450 korrels/m² te worden gezaaid.

Onkruidbestrijding

Alle erkende herbiciden kunnen op TOMMI worden toegepast.

Stikstofbemesting

TOMMI valoriseert een hoge stikstofgifte. Deze dient evenwel berekeneerd te worden toegediend. Om de uitstoeling te bevorderen, wordt best een vrij hoge eerste N-fractie toegediend, gevolgd door een gemiddelde tweede N-fractie. Om het eiwitgehalte nog te verhogen wordt best een zeer hoge laatste fractie toegediend. Dit draagt bovendien bij tot een hogere opbrengst.

Halmverstevinging

TOMMI is een lange tarwe, doch zeer stevig. Toch verdient het aanbeveling een degelijke halmverstevinging toe te passen.

Ziektebestrijding

Gezien de eerste N-fractie vroeg wordt toegediend is het aangewezen de eerste fungicidenbehandeling tijdig toe te passen. De tweede fungicidenbehandeling gebeurt best in het stadium "alle aren uit".

