

ONKRUIDBESTRIJDINGSADVIES INULINECICHOREI 2009: (alle genoemde doseringen zijn per hectare)

ALGEMEEN:

- > Gebruik herbiciden alleen met inachtneming van de officiële toepassingsvoorschriften!
- > Dit geldt ook voor de maximale dosering per seizoen per product.
- > Onkruidbestrijding vraagt een perceelsspecifieke aanpak! Raadpleeg uw cichoreiagent! Onderstaande adviezen zijn algemeen.
- > Herhaalde na-opkomst-besputtingen met korte intervallen (4-7 dagen), zijn voorwaarde voor succes!
- > Mechanische onkruidbestrijding kan een strategie met herbiciden verstoren (verstoring bodemherbiciden).
- > Werking van bodemherbiciden kan bij droogte en bij hoge org. stof-gehalten van de bodem tegenvallen.
- > Voor bestrijding van grassen is Fusilade Max toegelaten in de teelt van cichorei.
- > Sensus aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, die het gevolg is van handelingen of beslissingen gebaseerd op informatie in deze schema's.

A. Pas op met **chloorprofam** in de omgeving van gevoelige gewassen zoals bloeiende boomgaarden, gewassen, e.d.!

ZAVEL/KLEI:

1	voor zaai	begin schoon! Bestrijd overblijvende onkruiden met 2-3 l Roundup.
2	bij, of direct na, zaai	2 kg propyzamide + 1 l Asulox ⁽¹⁾ + 2 l Chloor IPC
3	na zaai, ruim vóór opkomst	indien er onkruiden bovengkomen zijn vóór cichorei: 2 - 3 ltr Finale SL 14 ⁽²⁾
4	na-opkomst 1 (±80% opkomst)	0,5 l Chloor IPC ⁽³⁾ + 5 gr Safari + 0,5 l Legurame + 200 gr propyzamide
5	na-opkomst 2 (1-echt-blad) en verder	Mix als besputting 4, met toenemende doseringen Chloor IPC en Safari. Doseringen afhankelijk van gewasstand. Per echt cichoreiblاد kan 0,1 l Dual Gold of 0,1 l Stomp (bij Melganzevoet) worden toegevoegd aan de mix.

B. Pas op met **chloorprofam** in de omgeving van gevoelige gewassen zoals bloeiende boomgaarden, gewassen, e.d.!

ZAND/DAL:

1	voor zaai	begin schoon! Bestrijd overblijvende onkruiden met 2-3 l Roundup.
2	bij, of direct na, zaai	0-2 kg propyzamide + 2 ltr Chloor IPC
3	na zaai, ruim vóór opkomst	indien er onkruiden bovengkomen zijn vóór cichorei: 2 - 3 ltr Finale SL 14 ⁽²⁾
4	na-opkomst 1 (±80% opkomst)	0,5 ltr Chloor IPC ⁽³⁾ + 5 gr Safari + 0,5 ltr Legurame + 200 gr propyzamide
5	na-opkomst 2 (1-echt-blad) en verder	Mix als besputting 4, met toenemende doseringen Chloor IPC en Safari. Doseringen afhankelijk van gewasstand. Per echt cichoreiblاد kan 0,1 l Dual Gold of 0,1 l Stomp (bij Melganzevoet) worden toegevoegd aan de mix.

(1) op 'zware' kleigrond eventueel dosering Asulox verhogen naar 2 ltr/ha.

(2) bij regen na toepassing en/of niet goed gesloten grond (scheurtjes) is er risico op wegvallende cichoreiplantjes.

(3) bij onregelmatige opkomst en gunstige omstandigheden voor onkruidbestrijding (vochtig): 1^e bsp. na-opkomst alleen 0,5 l Chloor IPC.