



# INFO

## DOUBLET

### Multiresistente bladrammenas

Doublet is het eerste multiresistente bladrammenas-ras. Naast de hoogste resistentie tegen het bietencystealtje (BCA 1) is het ras namelijk ook resistent tegen *Meloidogyne chitwoodi* en *fallax*, *Prathylenchus scripnerie* en het Tabaksratelvirus en is het een niet waard plant voor diverse nematoden. De vele resistenties in combinatie met de goede beworteling van bladrammenas brengen uw bodem in perfecte staat voor het aankomende gewas.

### Technische informatie

#### Landbouwkundige eigenschappen


- Goede beginontwikkeling en zeer goede bodembedekking;
- Extreem laat in bloei, zowel in voorjaars als zomerzaai;
- Uitstekende hergroei na maaien;
- Geen legering;
- Zeer stevige stengel;
- Zeer goede knolontwikkeling.

#### Doublet is herkenbaar aan

- Een kort blad in een rozet;
- Donkergroene bladeren;
- Een wit-violette kleur;
- En een gemiddelde knolgrootte.

### Resistenties

- Hoogste resistentie tegen bietencystealtje (*Heterodera schachtii* en *betae*);
- Resistent tegen (bedrieglijk) wortelknobbelaaltje (*Meloidogyne chitwoodi* en *fallax*);
- Resistent tegen *Prathylenchus scripnerie*;
- Resistent tegen Tabaksratelvirus;
- Slechte vermeerderaar voor *Paratrichodorus teres*;
- Niet waard plant voor de nematoden:
  - *Globodera rostochiensis* / *pallida*;
  - *Heterodera avenae*;
  - *Heterodera trifolii* f.sp. *trifolium*;
  - *Meloidogyne naasi*;
  - *Ditylenchus dipsaci*; *Ditylenchus destructor*.



### Teeltadvies

**Zaaitijdstip:** Voorjaar; april-mei, najaar; juli-augustus

**Zaaihoeveelheid:** Voorjaar: 25-30 kg/ha, najaar: 20-25 kg/ha  
(hoeveelheid ook afhankelijk van zaaimethode)




**Zaai- en bereiding:** Vergelijkbaar met inzaai van zomergranen.

In de stoppel de grond voldoende openrijden.

**Bemesting:** Voorjaar: ongeveer 30- 50 kg N/ha, najaar: ongeveer 50 kg N/ha

**Onderwerpen:** Indien nodig, voor de grondbewerking maaien.

## Raseigenschappen van bladrammenas bij voorjaarsuitzaai (lokgewas)

Rubricering	Rasnaam	BCA1 resistentie	Resistentie tegen Meloidogyne chitwoodi *	Meervoudige aaltjes-resistentie	Snelheid grondbedekking	Laatheid bloei	Hergroei na maaien (bij > 50% bloei)
A	 Doublet	✓	✓	✓	6,5	8,5	7
A	 Ramses	✓			7	8,5	6,5
A	 Final	✓			6,5	8,5	7
A	Terranova		✓		7	8	7
A	Anaconda		✓		7,5	7,5	6,5
N	Dracula		✓		6	8,5	9
N	Radetzky		✓		6,5	6,5	8,5
N	Maximus	✓			7,5	8,5	7,5
N	Contra	✓			7	8,5	6,5



### \* Resistentie tegen maïs-wortelknobbelaaltje (Meloidogyne chitwoodi)

Wanneer een ras een relatieve vatbaarheid heeft van 6% of lager ten opzichte van het gemiddelde van de vatbare rassen Siletina en Radical wordt het ras aangemerkt als resistent. De relatieve vatbaarheid van een ras wordt bepaald aan de hand van het gewogen gemiddelde van twee testen uitgevoerd met M. chitwoodi (Smakt populatie) door HZPC R&D BV.

bron: Aanbevelende Rassenlijst Akkerbouw 2011

bron: Aanbevelende Rassenlijst Akkerbouw 2011, gemiddelde van 2005 t/m 2010

## Raseigenschappen van bladrammenas bij najaarsuitzaai (stoppelgewas)

Rubricering	Rasnaam	BCA1 resistentie	Resistentie tegen Meloidogyne chitwoodi *	Meervoudige aaltjes-resistentie	Snelheid grondbedekking	Laatheid bloei	Mate van knolontwikkeling	Lengte (relatief, 100 = 68 cm)	Stevigheid	Resistentie tegen Alternaria
A	 Doublet	✓	✓	✓	7	8,5	7	79	-	7,5
A	 Final	✓			7	9	9	83	9	6
A	Comet	✓			7	8,5	8	112	8	8,5
A	Colonel	✓			7,5	7	8,5	117	6	8
N	Maximus	✓			8	8,5	7,5	107	-	7,5
N	Contra	✓			7,5	9	8	90	-	6,5
N	Dracula		✓		7	9	8,5	69	-	5,5
N	Radetzky		✓		7	8,5	8	78	-	7

Doublet bestellen? Neem contact op met uw zaaizaadleverancier

Limagrain Nederland BV  
Postbus 1  
4410 AA Rilland  
0113 55 71 00



[www.limagrain.nl](http://www.limagrain.nl)