

# Tabasco

## wintertarwe

Tabasco is het meest geteelde ras in Nederland en opgenomen op de Aanbevelende Rassenlijst. Tabasco wordt veel geteeld in Duitsland, Denemarken, België en Polen. Tabasco combineert zeer goede resistenties met zeer hoge opbrengsten.

**Relatieve korrelopbrengsten van Tabasco per regio:**  
(gemiddelde ten opzichte van standaardrassen 2006-2011)

Regio	Met ziektebestrijding	Zonder ziektebestrijding
Noordelijke Zeeklei	101	102
Centrale Zeeklei	106	109
Zuidwestelijke Zeeklei	103	104
Rivier / Loss	104	103
Zand en dalgrond	102	108

Bron: CSAR Aanbevelende Rassenlijst 2012

### Kwaliteit

Tabasco is in Nederland opgenomen in de categorie "Overige tarwe". In Duitsland is Tabasco opgenomen als voer / biscuit tarwe (C / keks weizen).

### Groeiregulatie

Om de maximale opbrengstpotentie te bereiken onder high-input omstandigheden is een gestructureerde toepassing van een groeiregulator (CCC en / of Moddus) gewenst. Een eerste toepassing als de eerste knoop goed voelbaar is (Zadoks GS 31), gevolgd door een tweede toepassing ongeveer 7-10 dagen later (Zadoks GS 34-37) geldt als algemene richtlijn. N.B. Moddus is niet toegelaten in zaaizaadvermeerdering.

## Tabasco in cijfers (gemiddelden 2008 t/m 2011)

Kwaliteit		Landbouwkundig		Resistentie niveau		
Bakkwaliteit	Overige tarwe	Wintervastheid	--	Meeldauw	8.5	
		Lengte stro*	96	Gele roest	9.0	
		Stevigheid	7.5	Bruine roest	9.0	
Korrelhardheid classificatie	Zacht	Vroegheid aar	5.5	Bladvlekkenziekte	8.0	
		Vroegrijpheid	5.5	Fusarium in de aar	6.5	
				Schot	6.5	
		* 100 = 90 cm				

Bron: CSAR Aanbevelende Rassenlijst

# TEELTBESCHRIJVING

## Ziekteresistenties

Tabasco heeft zeer goede ziekteresistenties. Om echter een maximale opbrengst te verwezenlijken is een optimale ziektebestrijding gewenst. Een bespuiting tegen afrijpingsziekten is zelfs voor rassen met een hoog resistentie niveau lonend. Door het hoge niveau van ziekteresistenties moet een zeer late toepassing van strobilurines worden vermeden, daar dit een moeilijk afrijpend gewas tot gevolg kan hebben.

## Zaaizaadhoeveelheid

Tabasco is een goed stoelend ras. Zaaizaad hoeveelheden moeten berekend worden zodat een maximum van 250 planten per m<sup>2</sup> in het voorjaar verkregen wordt.

DKG	Goede omstandigheden	Gemiddelde omstandigheden	Slechte omstandigheden
45 gr.	140 kg / ha	160 kg / ha	180 kg / ha
50 gr	155 kg / ha	175 kg / ha	200 kg / ha
55 gr	170 kg / ha	195 kg / ha	220 kg / ha

## Stikstofbemesting

De hoogte van de stikstofbemesting is in sterke mate bepalend voor de uiteindelijke gewasproductie en de korrelopbrengst. Geef in het voorjaar **140 kg N / ha**, minus de bodemvoorraad. Voor een tweede gift kan een hoeveelheid van **50-65 kg N / ha** worden geadviseerd (Zadoks GS 31-32). Daarna kan tijdens het vlagbladstadium (Zadoks GS 39-43) nog een derde gift **van 30-45 kg N / ha** worden gegeven.

De bovenstaande richtlijnen zijn slechts algemeen. Voor specifieke teeltadviezen raadpleeg uw lokale teeltbegeleider.

Hoewel elke voorzorg is genomen om betrouwbare en accurate adviezen te verstrekken, kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan dit schrijven.