

Rassenadvies gele en rode zaaiuien

Een gepast ras kiezen is perceel afhankelijk en dus maatwerk. Bespreek daarom met uw CZAV adviseur wat de beste strategie kan zijn. In onderstaande tabel zijn de rassen opgenomen die CZAV adviseert.

		Bewaarperiode		
		Afland/Kort	Midden	Lang
Oogst-tijdstip	Vroeg	Hybing	Hypark - Red Rover	Centro
	Midden	Summit	Hytech - Hyway - Hybelle	Rockito - Red Tide
	Laat		Donna - Red Baron	Dormo - Viggo - Hyfive - Romy

De rassen in **rode letters** zijn rode zaaiuien

Aandachtspunten en tips

- Voor een uiteindelijk goed plantaantal adviseren we afhankelijk van grondsoort, zaaimoment en zaaiomstandigheden bij gele uien tussen de 3,6 en 4,0 eenheden te zaaien en bij rode tussen de 3,1 en 3,4 eenheden. Bij Priming \pm 10% minder zaaien.
- Door het gebruik van de startmeststof **Quikstart** en **geprimed** zaaizaad wordt de opkomst van het gewas versnelt/verbeterd. Hierdoor wordt ook de kans op aantasting van bodeminsecten (o.a. bonen- en uienvlieg) kleiner.
- Indien er kans is op een lichte besmetting **Fusarium**, kies dan voor het tolerante (niet resistent!) ras Hysky/Hygate. Is er in het verleden al eens een Fusarium aantasting geweest, overweeg dan een ander perceel te kiezen.
- Nu de **Vydate** weggevallen is onderzoeken we al enkele jaren alternatieven als Nemguard en Nemater. Verwacht je een probleem met aaltjes of andere bodeminsecten bespreek de mogelijkheden op voorhand met uw CZAV adviseur.
- Zorg dat gewasresten van de voorvrucht en vaste mest goed en vroeg ingewerkt zijn en niet aan de oppervlakte liggen. Hierdoor verlaagt de kans op aantasting van **bonenvlieg** voor/tijdens opkomst.
- Teelt u regelmatig granen en/of graszaad dan is er hogere kans op **ritnaaldenschade** o.a. in uien. Via de module 'Mijn kniptor monitor' op 'Mijn CZAV' krijgt u advies over het optimale tijdstip om de kniptor te bestrijden.
- Door inzet van steriele insectentechniek (SIT) wordt de schade van de **uienvlieg** onder controle gehouden.



groei door kennis



T 0113 62 90 00
www.czav.nl

© CS - 1123

Rassenadvies Zaaiuien

2024



“Mijn overzicht van alle uienrassen, met tips en teeltadvies.”

Teler Anne



groei door kennis



Raseigenschappen en -opbrengsten op kleigrond

Ras	Zaadhuis	Vroegheid ¹	Vorm ²	Uniformiteit ³	Huidvastheidsindex ⁴	Hardheidsindex ⁵	Drogestof gehalte ⁶ (relatief)	Eénkernigheidsindex ⁷	Spruitrust ⁸	Netto-opbrengst 2017 t/m 2022 ⁹	
										ZW NL	Midden NL
Nation	Syn	7,9	1,8	2,5	99	93	95	71	5,8	95	100
Novista	TAK	7,5	1,9	2,5	97	89	99	54	5,8	92	90
SV 3557 ND	Sem	7,5	1,8	2,4	99	96	98	87	5,8	101	92
Hypark	DGS	7,3	1,9	2,6	98	93	97	84	5,4	99	101
Centro	Haz	7,1	1,9	2,4	99	96	100	79	5,5	100	97
Paradiso	Haz	7,0	1,8	2,6	101	112	103	74	5,9	96	96
Hybound	DGS	7,0	1,8	2,6	100	95	100	83	5,7	101	106
Bruce	TAK	6,8	2,0	2,7	99	94	104	57	5,9	99	93
Rockito	Sem	6,8	1,8	2,6	102	106	98	85	5,8	99	93
Firmo	Haz	6,6	1,8	2,4	100	107	103	67	5,7	94	91
Bossito	Sem	6,5	1,8	2,6	100	101	103	75	5,2	93	93
Hyroad	DGS	6,5	1,8	2,7	101	102	103	88	5,8	99	100
Klondike 4400	KBZ	6,5	1,9	2,4	99	98	101	62	5,4	98	96
Hybelle	DGS	6,4	1,9	2,6	99	97	99	83	5,4	103	108
Bingo	KBZ	6,4	1,9	2,3	100	91	102	64	5,2	97	101
Hyway	DGS	6,3	1,9	2,6	99	95	100	84	5,7	102	106
Motion	Syn	6,2	1,9	2,6	101	98	97	78	5,5	103	104
Dormo	Haz	6,2	1,9	2,6	101	113	101	78	5,7	96	100
Promotion	Syn	6,2	1,8	2,6	101	98	98	75	5,5	101	105
Donna	HoZ	5,9	1,8	2,2	100	93	99	85	5,4	105	108
Progression	Syn	5,8	1,8	2,6	102	111	103	79	5,6	94	96
Hyfive	DGS	5,6	1,7	2,6	101	102	101	85	5,5	105	102
Hystore	DGS	5,4	1,9	2,4	100	97	99	79	5,6	101	102
Delta Gigant ¹⁰	DSH	5,4	1,9	2,5	101	112	96	86	6,1	107	111
Hoza ¹⁰	HoZ	4,9	1,9	2,3	101	104	103	89	5,4	103	104


100 = ... ton/ha

63,0 63,0

¹ gebaseerd op vroegheid strijken; hoger cijfer = vroeger. ² 1-1,3 = hooggrond; 1,4-1,6 = hooggrond - rond; 1,7-2,0 = rond; 2,1 en hoger = rond - platrond. ³ 1 = minder dan 10% afwijkende vorm; 3 = meer dan 25% afwijkende vorm. ⁴ hoger getal = betere huidvastheid; 100 = gemiddelde van alle rassen; dit is geen maat voor het percentage kale uien. ⁵ hoger getal = harder; 100 = gemiddelde van alle rassen. ⁶ 100 = gemiddelde van alle rassen. ⁷ percentage uien met 1 hart of 2 harten op korte afstand van elkaar. ⁸ hoger cijfer = langere spruitrust. ⁹ opbrengst na korte bewaring (eind januari; Zand) c.q. lange bewaring (mei; Klei) > 35 mm, exclusief rotte of kale uien en schillen; 100 = gemiddelde van alle rassen. ¹⁰ bij Hoza en Delta Gigant is 10% meer zaad gebruikt dan bij de andere rassen, overeenkomstig het praktijkadvies voor deze rassen.

Kwaliteits- en opbrengstindex

In onderstaande grafiek zijn de rassen afkomstig van Uireka rassenlijst ingedeeld op basis van opbrengst en kwaliteitseigenschappen.



groei door kennis

www.cropsolutions.eu